FICHE VARIETALE

SOMIZE
(CACTUS)

Nom Botanique	Origine	Obtention	Mainteneur	Agroécologie
Opuntia inermis	District d'Ambovombe	Sélection massale	CTAS	Zone Sud et Sud-ouest











CARACTERES MORPHOLOGIQUES	
TIGE	
Port :	*étalé**
Couleur :	*verte claire*
CLADODE	
Couleur :	*vert clair*
Forme:	*obovale large**
Epaisseur :	*moyenne*
Largeur de phylloclade (cm):	*15 à 27*
Longueur phylloclade (cm)	*24 à 30*
Pilosité de la surface:	*lisse*
Nombre d'épines par aréole:	*1-2 (rare)*
Epine couleur principale	*gris*
Longueur d'épines(mm):	*1 - 10*
FLEUR	
Couleur :	*jaune*
Couleur de filaments de l'étamine :	*vert à jaune*
Couleur de stigmate :	*vert à jaune*
FRUIT	
Couleur :	*jaune orange (à maturité)*
Forme:	*obovale*
Longueur (cm) :	*4- 7*
Nombre par cladode:	*5 - 13*
Section :	*ronde*
Couleur de graine:	*marron*
CHAIR	
Couleur :	*jaune orange*
CARACTERES AGRONOMIQUES	
Période de floraison :	*octobre - décembre*
Période de maturité de fruit :	*décembre - février*
Photopériodisme :	*oui, jour long*
Goût:	*sucré*
EXIGENCES PARTICULIERES	
Age de la plante mère :	*à partir de la 2ème année de culture*
Cladodes autorisées pour la multiplication :	*phylloclades de 2ème ordre*
ASSOCIATIONS CULTURALES AUTORSEES	
Espèces associées :	céréales ou légumineuses

* *Caractère distinctif de la variété*